УДК 544.51+535.379+535.35

**УСИЛЕНИЕ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ПРИ ОКИСЛЕНИИ
ДИИЗОБУТИЛАЛЮМИНИЙГИДРИДА КИСЛОРОДОМ
В ТЕТРАГИДРОФУРАНЕ ИОННЫМИ ЛЮМИНОФОРАМИ
 Tb^{3+} , Eu^{2+} , $Ru(bpy)_3^{2+}$**

© Д. И. Галимов^{1*}, С. М. Якупова¹, Р. Г. Булгаков²

¹Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН
Россия, Республика Башкортостан, 450075 г. Уфа, пр. Октября, 141.

Тел./факс: +7 (347) 284-27-50.

*Email: galimovdi@mail.ru

²Институт физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН
Россия, Республика Башкортостан, 450054 г. Уфа, пр. Октября, 71.

С применением методов фото- и хемилюминесценции обнаружен и количественно изучен эффект усиления хемилюминесценции при окислении диизобутилалюминийгидрида кислородом в тетрагидрофуране ионными люминофорами Tb^{3+} , Eu^{2+} , $Ru(bpy)_3^{2+}$. Эффект усиления хемилюминесценции обусловлен передачей энергии от продукта реакции окисления первичного эмиттера свечения – триплетно-возбужденного изомасляного альдегида на ионные люминофоры.

Ключевые слова: ионные люминофоры, Tb^{3+} , Eu^{2+} , $Ru(bpy)_3^{2+}$, хемилюминесценция, передача энергии.

Введение

В настоящее время хемилюминесценция (ХЛ) – явление излучения света возбужденными продуктами химической реакции – находит широкое применение для изучения механизмов химических реакций, аналитической химии, создании мощных химических лазеров, а также в медицине [1–11]. В качестве излучателей света (эмиттеров ХЛ) могут выступать как органические вещества [8–9], так и не органические представители, в т.ч. и ионы лантанидов в электронно-возбужденном состоянии: трехвалентные Ln^{3+} [5–6] (в подавляющем большинстве случаев) и двухвалентные Ln^{2+} . Последние в этом качестве обнаружены совсем недавно [12–14]. Эмиттеры ХЛ могут возбуждаться непосредственно в элементарном акте химической реакции (*direct CL*) или в результате передачи на них энергии от первично-возбужденного продукта реакции (*indirect CL*). Оба механизма возбуждения эмиттеров хорошо известны для трехвалентных ионов лантанидов. Что касается ионов двухвалентных лантанидов, то их возбуждение до Ln^{2+} в хемилюминесцентных реакциях также обнаружены только в работах [12–13]. Как известно, окисление алюминийалкилов в растворе сопровождается ХЛ, обусловленной излучением триплетно-возбужденных карбонильных продуктов: альдегидов или кетонов [4]. Последние образуются в реакции диспропорционирования пероксильных радикалов – интермедиатов окисления. В частности, ХЛ при окислении диизобутилалюминийгидрида (Bu_2AlH) кислородом в ТГФ обусловлена излучением триплетно-возбужденного изомасляного альдегида – молекулярного продукта окисления [14].

В представленной нами работе впервые изучен механизм усиления ХЛ при окислении Bu_2AlH

кислородом ионными люминофорами Tb^{3+} , Eu^{2+} , $Ru(bpy)_3^{2+}$.

Экспериментальная часть

В работе использовали кристаллогидраты $LnCl_3 \cdot 6H_2O$ ($Ln = Eu, Tb$) и $Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O$ марки «ХЧ». Коммерческий раствор Bu_2AlH (73%) в толуоле использовали без дополнительной очистки. Растворитель ТГФ применяли свежеперегнанный после кетильной очистки [15].

Для изучения влияния люминофоров $TbCl_3 \cdot 6H_2O$ и $Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O$ на ХЛ в системе $EuCl_3 \cdot 6H_2O$ -ТГФ- Bu_2AlH - O_2 хемилюминесцентную кювету-реактор продували аргоном в течение 20 минут. Затем вносили в нее 0.02 мл раствора $EuCl_3 \cdot 6H_2O$ ($1.0 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$) в метаноле и 0.02 мл раствора $TbCl_3 \cdot 6H_2O$ (или $Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O$) в метаноле разной концентрации. Растворы $TbCl_3 \cdot 6H_2O$ и $Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O$ готовили разбавлением запасного раствора ($[TbCl_3 \cdot 6H_2O] = 1.0 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$; $[Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O] = 1.0 \text{ моль} \cdot \text{л}^{-1}$). К загруженным аликвотам растворов (0.02 мл) $EuCl_3 \cdot 6H_2O$ и $TbCl_3 \cdot 6H_2O$ или $EuCl_3 \cdot 6H_2O$ и $Ru(bpy)_3Cl_2 \cdot 6H_2O$ добавляли 2 мл ТГФ, предварительно насыщенного воздухом. Закрывали герметично реактор и помещали в хемилюминесцентную камеру. После этого вносили инсулиновым шприцем 0.8 ммоль Bu_2AlH (73% раствор в толуоле). Влияние концентрации Tb^{3+} и $Ru(bpy)_3^{2+}$ на интенсивность ХЛ изучено в интервале 10^{-7} – 10^{-2} М и 10^{-5} – 10^{-2} моль $\cdot$ л $^{-1}$, соответственно.

Спектры ФЛ, возбуждения ФЛ и времена жизни возбужденных состояний регистрировали с применением модульного спектрофлуориметра FluoroLog-3 HoribaJobinYvon (модель FL-3-22). Спектры низкоинтенсивной ХЛ измеряли при помощи набора стеклянных граничных светофильтров. Обработку данных проводили по известной методике [16–17]. Спектры яркой ХЛ снимали с

применением регистрирующего узла спектрофлуориметра FluoroLog-3.

Обсуждение полученных результатов

При окислении $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ в ТГФ кислородом возникает ХЛ (далее фоновая ХЛ – ФХЛ) спектр которой содержит широкую полосу излучения триплетно-возбужденного изомасляного альдегида ($^3\text{Me}_2\text{CHC}(\text{H})=\text{O}^*$) в синей области спектра с $\lambda_{\text{max}} = 430 \pm 20$ нм [13]. Из-за недостаточной интенсивности спектр ФХЛ был снят с помощью граничных светофильтров. При загрузке в ТГФ твердого кристаллогидрата $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и добавлении избытка $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ европий переходит в раствор и восстанавливается до Eu^{2+} [13]. Одновременно наблюдается очень яркая голубая ХЛ (далее ХЛ-Eu), видимая даже не вооруженным глазом и обусловленная излучением иона Eu^{2+*} ($\lambda_{\text{max}} = 465$ нм). Благодаря высокой яркости спектр ХЛ-Eu удается измерить с помощью спектрофлуориметра, а отношение интенсивностей $\text{ХЛ-Eu}/\text{ФХЛ} = \sim 10^7$ [13].

Если в ТГФ вместо $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ загружается кристаллогидрат другого люминофора (0.02 ммоль), такого как $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ или $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, то при добавлении $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ (0.8 ммоль) также происходит переход ионов этих металлов в раствор, но уже без их восстановления. Это обусловлено тем, что потенциалы восстановления ионов Tb^{3+} (-3.7 В [19]) и Ru^{2+} (-1.5 В [20]), гораздо более отрицательные, чем у Eu^{3+} (-0.35 В [19].]. При этом также наблюдается ХЛ (далее ХЛ-Tb и ХЛ-Ru, соответственно), обусловленная излучением ионов Tb^{3+*} ($\lambda_{\text{max}} = 485, 542, 625$ нм) и $\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+*}$ ($\lambda_{\text{max}} = 567$ нм) (рис. 1, 2).

Рис. 1. Спектры ХЛ-Tb (1) и ФЛ (2) при взаимодействии $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0.02 ммоль) с $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ (0.8 ммоль) в ТГФ (2 мл), насыщенном воздухом, $\lambda_{\text{возб}} = 365$ нм, 298 К.

Положения указанных максимумов хорошо коррелируют с максимумами ФЛ соответствующих реакционных растворов: для тербия – $\lambda_{\text{max}} = 494, 545, 586, 616$ нм (рис. 1, 2), а для рутения – $\lambda_{\text{max}} = 570$ нм (рис. 2, 2), а также с максимумами ФЛ этих ионов, известными из литературы [21–22].

Рис. 2. Спектры ХЛ-Ru (1) и ФЛ (2) при взаимодействии $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0.02 ммоль) с $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ (0.8 ммоль) в ТГФ (2 мл), $\lambda_{\text{возб}} = 450$ нм, 298 К.

По сравнению с ФХЛ интенсивности ХЛ-Tb и ХЛ-Ru значительно выше, и соответствующие отношения $\text{ХЛ-Tb}/\text{ФХЛ} = 100$ и $\text{ХЛ-Ru}/\text{ФХЛ} = 50$ (рис. 3). В то же время по сравнению с ХЛ-Eu интенсивности ХЛ этих ионов значительно меньше. Важно отметить, что в присутствии любого из трех ионов-люминофоров: Eu^{2+} , Tb^{3+} и $\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}$, увеличение интенсивности свечения происходит без изменения формы кинетической кривой относительно ФХЛ (рис. 3).

Рис. 3. Кинетика ХЛ в ТГФ при 298 К. 1 – ФХЛ (интенсивность увеличена в $1 \cdot 10^6$); 2 – ХЛ-Eu, 3 – ХЛ-Tb (интенсивность увеличена в $7 \cdot 10^4$); 4 – ХЛ-Ru (интенсивность увеличена в $1 \cdot 10^5$).

Таким образом, все три иона можно характеризовать как усилители ХЛ, а само усиление ХЛ отнести к молекулярно-ионному переносу энергии от молекул $^3\text{Me}_2\text{CHC}(\text{H})=\text{O}^*$ на эти ионы с образованием их электронно-возбужденных состояний, которые дезактивируются с испусканием ХЛ-Eu (1), ХЛ-Tb (2), ХЛ-Ru (3) (Схема 1). Образование первичного эмиттера ФХЛ на схеме дано в упрощенном виде, на самом деле $^3\text{Me}_2\text{CHC}(\text{H})=\text{O}^*$ образуется в реакции диспропорционирования пероксильных радикалов – интермедиатов окисления $\text{Bu}^{\text{I}}_2\text{AlH}$ [4; 13; 18].

Схема 1

Значительно большее усиление интенсивности свечения ХЛ-Tb и ХЛ-Ru по сравнению с ФХЛ обнаружено при совместной загрузке пары $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (далее ХЛ-Eu-Tb) или пары $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и $\text{Ru(bpy)}_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (далее ХЛ-Eu-Ru) (рис. 4). Соответствующие коэффициенты усиления свечения относительно ФХЛ в этих парах составили $1.2 \cdot 10^6$ и $4.2 \cdot 10^4$. Для ХЛ-Eu этот коэффициент равен $8.9 \cdot 10^6$.

Рис. 4. Кинетика ХЛ-Eu-Tb (1) и ХЛ-Eu-Ru (2).

Интересно, что спектры свечения при совместном нахождении в реакционном растворе двух ионов-люминофоров, проявляют люминесценцию обоих ионов. Так, спектр ХЛ-Eu-Tb содержит максимумы излучения как Eu^{2+*} (465 нм), так и Tb^{3+*} (485, 542, 584 нм) (рис. 1; 5). В случае ХЛ-Eu-Ru проявляются: максимум европия при 437 нм, а также — иона Ru(bpy)_3^{2+*} в виде перегиба при 560–570 нм (рис. 2; 5).

Рис. 5. Спектры ХЛ. 1 – ХЛ-Eu-Tb, 2 и 2' – ХЛ-Eu-Ru без и со светофильтром ЖС-17 соответственно.

Однако более четко выявить люминесценцию Ru(bpy)_3^{2+*} в виде характерного максимума при 570 нм (рис. 2; 5) удастся при регистрации спектра через граничный светофильтр ЖС-17, отсекающий голубое свечение иона Eu^{2+*} . Эта двуликость спектров свечения имеет место и при визуальном наблюдении ХЛ-Eu-Tb в затемненной комнате. Так, сначала отчетливо видно ярко-голубое свечение европия(II), но через граничный светофильтр ЖС-17, становится хорошо видна и зеленая ХЛ иона Tb^{3+*} . В тоже время при визуальном наблюдении ХЛ-Eu-Ru в затемненной комнате хорошо видно, как интенсивное голубое, так и красное свечение бипиридилного катиона рутения.

Установлено, что при наблюдении парной ХЛ увеличение концентрации $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в интервале $1 \cdot 10^{-7}$ – $1 \cdot 10^{-2}$ М или $\text{Ru(bpy)}_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ в интервале $1 \cdot 10^{-5}$ – $1 \cdot 10^{-2}$ М приводит к уменьшению интенсивности максимума излучения Eu^{2+*} (рис. 6), что однозначно свидетельствует о передаче энергии от иона Eu^{2+*} на катионы Tb^{3+} и Ru(bpy)_3^{2+} . Отметим, что ранее тушение люминесценции Eu^{2+*} ионами других металлов в растворе в литературе не описано.

Причиной указанного отклонения от линейности может служить эффект внутреннего фильтра, обусловленный поглощением излучения иона Eu^{2+*} комплексами ионов Tb^{3+} или Ru(bpy)_3^{2+} . Кроме того, нельзя исключить тушение Eu^{2+*} за счет снижения концентрации первичного эмиттера ${}^3\text{Me}_2\text{CHC(H)=O}^*$ в результате его тушения при передаче энергии на ион Tb^{3+} или Ru(bpy)_3^{2+} . Загрузки в ТГФ в дополнении к $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ соли $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (или $\text{Ru(bpy)}_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) также уменьшают время жизни ионов Eu^{2+*} в реакционном растворе (рис. 7). В этом случае также имеет место отклонение от линейности штерн-вольмеровской концентрационной зависимости от времени жизни ионов Eu^{2+*} . Отмеченные отклонения от линейности также могут быть связаны с уменьшением концентрации Bu^i_2AlH в результате дополнительного расходования в реакциях дегидратации кристаллогидратов $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ или $\text{Ru(bpy)}_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Уменьшение концентрации Bu^i_2AlH приводит к отклонению графика зависимости в сторону оси абсцисс.

Несмотря на отсутствие линейности штерн-вольмеровской зависимости экспериментально были установлены следующие закономерности, указывающие на противоположно направленные эффекты действия люминофоров.

Рис. 6. Зависимости интенсивности ХЛ-Eu-Tb (1) и ХЛ-Eu-Ru (2) от изменяемой концентрации загружаемых $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ или $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и их анаморфозы $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1') и $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2') в координатах $(I_0/I-1)-[\text{Ac}]$. $[\text{Tb}^{3+}] = 1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^{-2} \text{ M}$, $[\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}] = 1 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^{-2} \text{ M}$, 298 K.

Рис. 7. Зависимости времени жизни Eu^{2+*} в реакционном растворе от изменяемой концентрации загружаемых $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1) или $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2) и их анаморфозы: $\text{TbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (1') и $\text{Ru}(\text{bpy})_3\text{Cl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (2') в координатах $(\tau_0/\tau-1)-[\text{Ac}]$. $[\text{Tb}^{3+}] = 1 \cdot 10^{-7} \div 1 \cdot 10^{-2} \text{ M}$, $[\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}] = 1 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^{-2} \text{ M}$, 298 K.

С одной стороны, добавка люминофоров приводит к частичному тушению Eu^{2+*} за счет передачи энергии на люминофор. С другой стороны, ион Eu^{2+} выступает в качестве эффективного посредника в передаче энергии от первичного эмиттера $^3\text{Me}_2\text{CHC}(\text{H})=\text{O}^*$ на люминофор, что увеличивает интенсивность излучения люминофоров в присут-

ствии европия по сравнению с опытами, в которых люминофоры загружались без европия.

Выводы

Таким образом, нами обнаружен и количественно изучен эффект усиления ХЛ при окислении диизобутилалюминийгидрида кислородом ионными люминофорами Tb^{3+} , Eu^{2+} , $\text{Ru}(\text{bpy})_3^{2+}$, обусловленный передачей энергии от первичного эмиттера изомасляного альдегида на эти ионы. В связи с общим характером механизма окисления алюминийалкилов обнаруженный эффект усиления ХЛ несомненно будет проявляться и при окислении других алюминийалкилов.

Исследование проведено в соответствии с бюджетными темами ИНК УФИЦ РАН, ИФМК УФИЦ РАН и грантом РФФИ № 18-33-00201 мол. а.

ЛИТЕРАТУРА

- Naik P. D., Pavanaya U. B., Sapre A. V., Rama Rao K. V. S., Mittal J. P., Iyer R. M., Bajaj P. N. Chemiluminescent reactions of samarium with some chlorinated hydrocarbons // J. Photochem. Photobiol. 1988. Vol. 41. Pp. 285–292.
- Campbell A. K. Chemiluminescence: Principles and Applications in Biology and Medicine, Chichester: VCH Verlagsgesellschaft, Ellis Horwood, 1988, Pp. 608.
- Baeyens W. R. G., Schulman S. G., Calokerinos A. C., Zhao Y., MaGarcia Campan A., Nakashima K., De Keukeleire D. Chemiluminescence-based detection: principles and analytical applications in flowing streams and in immunoassays // J. Pharm. Biomed. Anal. 1998. Vol. 17. P. 941–953.
- Bulgakov R. G., Kazakov V. P., Tolstikov G. A. Chemiluminescence of organometallic compounds in solution // J. Organometall. Chemistry. 1990. Vol. 387. P. 11–64.
- Elbanowski M., Makowska B., Staninski K., Kaczmarek M. Chemiluminescence of systems containing lanthanide ions // J. Photochem. Photobiol. 2000. Vol. 130. P. 75–81.
- Lis S., Elbanowski M., Makowska B., Hnatejko Z. Energy transfer in solution of lanthanide complexes // J. Photochem. Photobiol. 2002. Vol. 150. P. 233–247.
- Jimenez A. M., Navas M. J. Chemiluminescence Methods (Present and Future) // Grasas y Aceites. 2002. Vol. 53. P. 64–75.
- Васильев Р. Ф., Цаплев Ю. Б. Хемилюминесценция, создаваемая светом // Успехи химии. 2006. Т. 75. №11. С. 1103–1118.
- Fedorova G. F., Trofimov A. V., Vasil'ev R. F., Veprintsev T. L. Peroxy-radical-mediated chemiluminescence: mechanistic diversity and fundamentals for antioxidant assay // Arkivoc. 2007. Vol. 8. P. 163–215.
- Kaczmarek M., Lis S. Chemiluminescence determination of tetracyclines using Fenton system in the presence europium(III) ions // Anal. Chim. Acta. 2009. Vol. 639. P. 96–100.
- Булгаков Р. Г., Сабиров Д. Ш., Джемилов У. М. Окисление фуллеренового иона // Изв. АН. Сер. хим. 2013. №2. С. 308–328.
- Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. The first observation of emission of electronically-excited states of the divalent Eu^{2+*} ion in the new chemiluminescent system $\text{EuCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}-\text{Bu}_2\text{AlH}-\text{O}_2$ and the energy transfer from Eu^{2+*} ion to the trivalent ion, Tb^{3+} // J. Lumin. 2013. Vol. 136. P. 95–99.
- Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. The first example of generation and emission of divalent Sm^{2+*} ion in a liquid-phase chemiluminescence in the system $\text{SmCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}-\text{THF}-\text{Bu}_2\text{AlH}-\text{O}_2$ // J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2015. Vol. 300. P. 1–5.
- Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. The first registration of a green liquid-phase chemiluminescence of the divalent Eu^{2+*} ion in interaction of β -diketonate complexes

- Eu(acac)₃·H₂O, Eu(dpm)₃, Eu(fod)₃ and Eu(CH₃COO)₃·6H₂O with Buⁱ₂AlH in THF with the participation of oxygen // RSC Adv. 2015. Vol. 5. P.52132–52140.
15. Гордон А., Форд Р., Спутник химика. М.: Мир, 1976. С. 541.
16. Беляков В. А., Васильев Р. Ф., Молекулярная фотоника, Л.: Наука, 1970, С. 70.
17. Васильев Р. Ф. Хемилюминесценция в растворах. I. Методы идентификации возбужденных состояний // Оптика и спектроскопия. 1965. Т. 18. С. 238–244.
18. Булаков Р. Г., Казаков В. П., Толстиков Г. А. Хемилюминесценция металлоорганических соединений. М.: Наука, 1989. С. 220.
19. Nugent L. J., Baybarz R. D., Burnett J. L. Electron-Transfer and d-Absorption Bands of Some Lanthanide and Actinide Complexes and the Standard (II-III) Oxidation Potential for Each Member of the Lanthanide and Actinide Series // J. Phys. Chem. 1973. Vol. 77. P. 1528–1539.
20. Kalyanasundaram K. Photophysics, photochemistry and solar energy conversion with tris(bipyridyl)ruthenium(II) and its analogues // Coord. Chem. Rev. 1982. Vol. 46. P.159–244.
21. Полуэктов Н. С., Кононенко Л. И., Ефрюшина Н. П., Бельтюкова С. В. Спектрофотометрические и люминесцентные методы определения лантаноидов. Киев: Наукова думка, 1989. С. 255.
22. White H. S., Bard A. J., Electrogenated Chemiluminescence and Chemiluminescence of the Ru(bpy)₃²⁺-Peroxydisulfate-System in Acetonitrile-Water Solutions // J. Am. Chem. Soc. 1982. Vol. 104. P. 6891–6895.

Поступила в редакцию 15.05.2018 г.

**ENHANCEMENT OF CHEMILUMINESCENCE IN OXIDATION
OF DIISOBUTYLALUMINUM HYDRIDE BY OXYGEN
IN TETRAHYDROFURAN BY IONIC LUMINOPHORES Tb³⁺, Eu²⁺, Ru(bpy)₃²⁺**

© D. I. Galimov^{1*}, S. M. Yakupova¹, R. G. Bulgakov²

¹*Institute of Petrochemistry and Catalysis, Ufa Federal Research Center, RAS
141 Oktyabrya Avenue, 450075 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.*

²*Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Center, RAS
71 Oktyabrya Avenue, 450054 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.*

Phone: +7 (347) 231 27 50.

*Email: galimovdi@mail.ru

Chemiluminescence (CL) is considered to be a characteristic feature of trialkylaluminum compounds with the number of carbon atoms ranging from two to twenty, their hydride- and halide-substituted derivatives, norbornene, isocamphene and cyclohexene derivatives. In addition, the CL of trialkylaluminum compounds and their hydride derivatives are promising for the creation of luminescent control of multi-tonnage industrial production of higher fatty alcohols (the Alfol process). This is due to the fact that the oxidation of these organoaluminum compounds (OAS) with air oxygen is the key step in this process. Therefore, the enhancement of CL intensity in the oxidation of organoaluminum compounds by oxygen is an important task. One of the effective ways to enhance CL is the use of ionic phosphors. However, for CL in the oxidation of OAS, the corresponding data were absent in the literature. In the present study, the effect of CL enhancement in the oxidation of diisobutylaluminum hydride by oxygen in tetrahydrofuran by the ionic phosphors Tb³⁺, Eu²⁺, Ru(bpy)₃²⁺ was found and quantitatively studied using photo- and chemiluminescence methods. The effect of enhancement of chemiluminescence is due to the energy transfer from the reaction product of the primary emission emitter - triplet-excited isobutyric aldehyde to ionic phosphors Tb³⁺, Eu²⁺, Ru(bpy)₃²⁺.

Keywords: ionic phosphors, Tb³⁺ ion, Eu²⁺ ion, Ru(bpy)₃²⁺, chemiluminescence, energy transfer.

Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.

REFERENCES

1. Naik P. D., Pavanaya U. B., Sapre A. V., Rama Rao K. V. S., Mittal J. P., Iyer R. M., Bajaj P. N. J. *Photochem. Photobiol.* 1988. Vol. 41. Pp. 285–292.
2. Campbell A. K. *Chemiluminescence: Principles and Applications in Biology and Medicine*. Chichester: Ellis Horwood, 1988. Pp. 608.
3. Baeyens W. R. G., Schulman S. G., Calokerinos A. C., Zhao Y. J. *Pharm. Biomed. Anal.* 1998. Vol. 17. Pp. 941–953.
4. Bulgakov R. G., Kazakov V. P., Tolstikov G. A. J. *Organometall. Chemistry*. 1990. Vol. 387. Pp. 11–64.
5. Elbanowski M., Makowska B., Staninski K., Kaczmarek M. J. *Photochem. Photobiol.* 2000. Vol. 130. Pp. 75–81.
6. Lis S., Elbanowski M., Makowska B., Hnatejko Z. J. *Photochem. Photobiol.* 2002. Vol. 150. Pp. 233–247.
7. Jimenez A. M., Navas M. J. *Grasas y Aceites*. 2002. Vol. 53. Pp. 64–75.
8. Vasil'ev R. F., Tsaplev Yu. B. *Uspekhi khimii*. 2006. Vol. 75. No. 11. Pp. 1103–1118.
9. Fedorova G. F., Trofimov A. V., Vasil'ev R. F., Veprintsev T. L. *Arkivoc*. 2007. Vol. 8. Pp. 163–215.
10. Kaczmarek M., Lis S. *Anal. Chim. Acta*. 2009. Vol. 639. Pp. 96–100.
11. Bulgakov R. G., Sabirov D. Sh., Dzhemilev U. M. *Izv. AN. Ser. khim.* 2013. No. 2. Pp. 308–328.
12. Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. J. *Lumin.* 2013. Vol. 136. Pp. 95–99.
13. Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. J. *Photochem. Photobiol. A: Chem.* 2015. Vol. 300. Pp. 1–5.
14. Bulgakov R. G., Eliseeva S. M., Galimov D. I. *RSC Adv.* 2015. Vol. 5. Pp. 52132–52140.
15. Gordon A., Ford R., *Sputnik khimika [The chemist's companion]*. Moscow: Mir, 1976. Pp. 541.
16. Belyakov V. A., Vasil'ev R. F., *Molekulyarnaya fotonika [Molecular photonics]*. Leningrad: Nauka, 1970. Pp. 70.
17. Vasil'ev R. F. *Optika i spektroskopiya*. 1965. Vol. 18. Pp. 238–244.
18. Bulgakov R. G., Kazakov V. P., Tolstikov G. A. *Khimiluminestsentsiya metalloorganicheskikh soedinenii [Chemiluminescence of organometallic compounds]*. Moscow: Nauka, 1989. Pp. 220.
19. Nugent L. J., Baybarz R. D., Burnett J. L. J. *Phys. Chem.* 1973. Vol. 77. Pp. 1528–1539.
20. Kalyanasundaram K. *Coord. Chem. Rev.* 1982. Vol. 46. Pp. 159–244.
21. Poluektov N. S., Kononenko L. I., Efryushina N. P., Bel'tyukova S. V. *Spektrofotometricheskie i luminestsentnye metody opredeleniya lantanoidov [Spectrophotometric and luminescent methods for determination of lanthanides]*. Kiev: Naukova dumka, 1989. Pp. 255.
22. White H. S., Bard A. J. J. *Am. Chem. Soc.* 1982. Vol. 104. Pp. 6891–6895.

Received 15.05.2018.