УДК 517.925.51+531.8

ОБ АСИМПТОТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ РЕШЕНИЙ ОДНОЙ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА.

© А. Р. Сагитова^{1*}, А. А. Кадырбердина²¹Башкирский государственный университет

Россия, Республика Башкортостан, 450076 г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32.

²Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

Россия, Республика Башкортостан, 450000 г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а.

Тел.: +7 (917) 344 17 77.

*Email: mohlesnoy@yandex.ru

В [1] доказана теорема об асимптотическом поведении фундаментальной системы решений для системы вида

$$\frac{dz}{dt} = (A + \varphi(t) + B(t))z,$$

где A – постоянная матрица с простыми собственными значениями, причем собственные значения $\lambda_i(t)$ матрицы $A + \varphi(t)$ имеют различные вещественные части, $\varphi \rightarrow 0$, при $t \rightarrow \infty$, а $\int_x^\infty \|d\varphi/dt\|dt < \infty$. Кроме того в ней накладывается весьма жесткое условие $\int_x^\infty \|B(t)\|dt < \infty$ на элементы матрицы $B(t)$.

В представленной работе доказана теорема об асимптотическом поведении фундаментальной системы решений системы

$$\frac{dz}{dt} = (A + Bf(t))z,$$

где $z = (z_1, z_2)^T$, B – постоянная матрица, A – матрица с различными вещественными собственными значениями, а $f(t)$ имеет суммируемую на бесконечности первообразную $\varphi(t) = \int_t^\infty f(\tau)d\tau < \infty$.

Ключевые слова: асимптотическое поведение решений систем дифференциальных уравнений.

Необходимость исследовать устойчивость систем в механике первоначально возникла при изучении равновесных положений систем. После чего потребовалась общая постановка задачи об устойчивости не только равновесия, но и движения.

Исследование критериев устойчивости движения многих механических систем часто сводится к анализу асимптотического поведения и устойчивости решений линейных дифференциальных уравнений. Рассматриваемые в работе уравнения представляют собой не только математический интерес, но и возникают в классической механике, электродинамике, теории колебаний [2].

В [1] доказана следующая теорема.

Теорема 1. Пусть

$$\frac{dy}{dt} = (A + \varphi(t) + B(t))y, \quad (1)$$

а) A – постоянная матрица с простыми собственными значениями;

б) $\varphi \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, а $\int_x^\infty \|d\varphi/dt\|dt < \infty$;

в) $\int_x^\infty \|B(t)\|dt < \infty$;

г) собственные значения $\lambda_i(t)$ матрицы $A + \varphi(t)$ имеют различные вещественные части.

Тогда существует n независимых решений $z^{(k)}(t)$ ($1 \leq k \leq n$) уравнения (1) таких, что при $t \rightarrow \infty$

$$z^{(k)}(t) = \left(\exp \int_{t_1}^t \lambda_k(\tau) d\tau \right) (c_k + o(1)),$$

где c_k – постоянный не нулевой вектор.

Условие (в) является весьма жестким и, по сути, означает, что элементы матрицы $B(t)$ являются убывающими функциями. В частности, условие (в)

означает, что в качестве элемента матрицы $B(t)$ нельзя брать функции вида $\sin e^t$. Мы докажем следующую теорему.

Теорема 2. Пусть

$$\frac{dz}{dt} = (A + Bf(t))z, \quad (2)$$

$z = \text{colon}(z_1, z_2)$, B – постоянная матрица, A – матрица с различными простыми вещественными собственными значениями, а первообразная функции $f(t)$, $\varphi(t) = \int_t^\infty f(\tau)d\tau$ – суммируема на бесконечности, тогда справедливы асимптотические формулы предыдущей теоремы.

Перейдем к доказательству теоремы 2. Известно, что существует невырожденная матрица T , которая приводит матрицу A к диагональному виду. Положим в системе (2) $z = Ty$, где y – новая неизвестная вектор-функция. Из этих преобразований следует $Ty' = ATy + BTf(t)y$. Умножая на T^{-1} , получим, что

$$y' = T^{-1}ATy + T^{-1}BTf(t)y = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} y + f(t) \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} y,$$

где $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ – диагональная матрица, $C =$

$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$ – постоянная матрица.

С помощью замены $y = e^{\lambda_1 t} u$ получим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = (c_{11}u_1 + c_{12}u_2)f(x) \\ \frac{du_2}{dt} = (\lambda_2 - \lambda_1)u_2 + (c_{21}u_1 + c_{22}u_2)f(x) \end{cases} \quad (3)$$

Эта система эквивалентна системе интегральных уравнений

$$\begin{cases} u_1(x) = 1 - \int_x^\infty (c_{11}u_1(t) + c_{12}u_2(t))f(t)dt \\ u_2(x) = - \int_x^\infty e^{-(\lambda_2-\lambda_1)(t-x)}(c_{21}u_1(t) + c_{22}u_2(t))f(t)dt \end{cases} \quad (4)$$

Используем метод последовательных приближений. Суть этого метода состоит в том, что сходимость рядов $u_1^0 + (u_1^1 - u_1^0) + (u_1^2 - u_1^1) + \dots$,

$u_2^0 + (u_2^1 - u_2^0) + (u_2^2 - u_2^1) + \dots$ равносильна сходимости последовательностей $u_1^{(n)}$, $u_2^{(n)}$. Положим, что $u_1^0 = 1$, $u_2^0 = 0$.

Применяя интегрирование по частям, получаем

$$\begin{aligned} u_1(x) &= 1 - \int_x^\infty (c_{11}u_1(t) + c_{12}u_2(t))f(t)dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} u = c_{11}u_1(t) + c_{12}u_2(t) \\ du = (c_{11}u_1' + c_{12}u_2')dt \\ dv = f(t)dt \\ v = \varphi(t) \end{array} \right| = \\ &= 1 + (c_{11}u_1(x) + c_{12}u_2(x))\varphi(x) + \\ &+ \int_x^\infty \varphi(t)(c_{11}u_1'(t) + c_{12}u_2'(t))dt \\ u_2(x) &= - \int_x^\infty e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}(c_{21}u_1(t) + c_{22}u_2(t))f(t)dt = \\ &= \left| \begin{array}{l} u = e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}(c_{21}u_1(t) + c_{22}u_2(t)) \\ dv = e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)} \left[-(\lambda_2-\lambda_1)(c_{21}u_1(t) + c_{22}u_2(t)) + \right. \\ \left. + (c_{21}u_1'(t) + c_{22}u_2'(t)) \right] dt \\ dv = f(t)dt \\ v = \varphi(t) \end{array} \right| = \\ &= (c_{21}u_1 + c_{22}u_2)\varphi(x) + \\ &+ \int_x^\infty \varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)} [-(\lambda_2-\lambda_1)(c_{21}u_1(t) + c_{22}u_2(t)) + \\ &+ (c_{21}u_1'(t) + c_{22}u_2'(t))]dt \end{aligned}$$

На первом шаге найдем u_1^1 .

$$\begin{aligned} u_1^1 &= 1 + (c_{11}u_1^0(x) + c_{12}u_2^0(x))\varphi(x) + \\ &+ \int_x^\infty \varphi(t)(c_{11}u_1^{0'} + c_{12}u_2^{0'})dt = 1 + c_{11}\varphi(x) \end{aligned}$$

Получаем $|u_1^1(x) - u_1^0(x)| \leq c_{11}\varphi^\varepsilon\varphi^{(1-\varepsilon)}$.

На втором шаге найдем $u_2^1(x)$.

$$\begin{aligned} u_2^1(x) &= 1 + (c_{11}u_1^1(x) + c_{12}u_2^1(x))\varphi(x) + \\ &+ \int_x^\infty \varphi(t)(c_{11}u_1^{1'}(t) + c_{12}u_2^{1'}(t))dt = \\ &= 1 + c_{11}\varphi + c_{11}^2\varphi^2 + c_{12}c_{21}\varphi^2 - c_{12}c_{21}(\lambda_2 - \lambda_1) \\ &\quad \varphi(x) \int_x^\infty \varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}dt + \\ &\quad + c_{12}c_{21} \int_x^\infty \varphi(t)f(t) + c_{11}^2 \int_x^\infty \varphi(t)f(t)dt \end{aligned}$$

Отсюда

$$|u_2^1(x) - u_1^1(x)| \leq 2c_{11}^2\varphi^{2\varepsilon}\varphi^{2(1-\varepsilon)} + 3c_{12}c_{21}\varphi^{2\varepsilon}\varphi^{2(1-\varepsilon)}.$$

По индукции аналогичная оценка устанавливается для $u_1^{(n)}$ приближения.

Далее рассмотрим $u_2^1(x)$. На первом шаге получим

$$u_2^1(x) = (c_{21}u_1^0(x) + c_{22}u_2^0(x))\varphi(x) +$$

$$\begin{aligned} &+ \int_x^\infty [-(\lambda_2 - \lambda_1)(c_{21}u_1^0 + c_{22}u_2^0)dx + \\ &+ (c_{21}u_1^{0'} + c_{22}u_2^{0'})\varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}] = \\ &= c_{21}\varphi - c_{21}(\lambda_2 - \lambda_1) \int_x^\infty \varphi e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}dt \end{aligned}$$

Получаем $|u_2^1(x) - u_1^1(x)| \leq 2c_{21}\varphi^\varepsilon\varphi^{(1-\varepsilon)}$.

На втором шаге получаем $u_2^2(x)$.

$$\begin{aligned} u_2^2(x) &= (c_{21}u_1^1(x) + c_{22}u_2^1(x))\varphi(x) + \\ &+ \int_x^\infty [(c_{21}u_1^{1'}(t) + c_{22}u_2^{1'}(t)) - \\ &- (\lambda_2 - \lambda_1)(c_{21}u_1^1(t) + c_{22}u_2^1(t))] \\ &\quad \varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}dt = \\ &= c_{21}(\varphi(x) + c_{11}^2\varphi(x)) + \\ &+ c_{21}\varphi(x) \left(\int_x^\infty \varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}dt \right) + \\ &+ \int_x^\infty [c_{11}c_{21}f(t) \\ &+ c_{21}c_{22}f(t) - (\lambda_2 - \lambda_1)(c_{21} + c_{21}\varphi(t)(c_{11} + c_{22}) - \\ &- c_{21}c_{22}(\lambda_2 - \lambda_1) \int_t^\infty \varphi(\tau)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(t-\tau)}d\tau) \varphi(t)e^{(\lambda_2-\lambda_1)(x-t)}dt] \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} |u_2^2 - u_2^1| &\leq 3c_{11}c_{21}\varphi^{2\varepsilon}\varphi^{2(1-\varepsilon)} + \\ &+ 5c_{21}c_{22}\varphi^{2\varepsilon}\varphi^{2(1-\varepsilon)} \end{aligned}$$

По индукции аналогичная оценка устанавливается для n -ого приближения.

Таким образом, ряды мажорируются сходящейся геометрической прогрессией. Поэтому все ряды сходятся равномерно на интервале (x_0, ∞) . Тогда согласно лемме 1 из [2] наша система (3) имеет два решения $z_1(t)$ и $z_2(t)$, такие, что $\lim_{x \rightarrow \infty} u_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} u_2(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Возвращаясь к вектору $z(t)$, получаем, что для него справедливы асимптотические формулы

$$z^{(k)}(t) = e^{\int_{t_1}^t \lambda_k(t_1)dt_1} (c_k + o(1)),$$

где c_k — постоянный ненулевой вектор. Отсюда, в частности, следует, что если λ_1 и λ_2 отрицательны, то ненулевое решение системы (2) асимптотически устойчиво по Ляпунову.

Замечание. Все сказанное справедливо и в случае, когда собственные значения являются комплексными с отрицательными вещественными частями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беллман Р. Э. Теория устойчивости решений дифференциальных уравнений. М.: изд-во иностранной литературы. 1954. С. 196.

2. Меркин Д. Р. Введение в теорию устойчивости движения. М.: Наука. 1987. С. 304.
3. Наймарк М. А. Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука. 1969. С. 476.
4. Назирова Э. А., Сагитова А. Р., Кадырбердина А. А. Об асимптотической устойчивости по Ляпунову одной системы дифференциальных уравнений // Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22. №3. С. 632–634.
5. Сагитова А. Р., Кадырбердина А. А. Об устойчивости линейных систем дифференциальных уравнений с быстро осциллирующей матрицей // Спектральная теория и смежные вопросы. Сб. тезисов междунар. конф. Уфа. 2018. С. 137–138.
6. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения // 3-е изд. СПб.: Лань. 2003. С. 448.
7. Федорюк М. В. Асимптотические методы для линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. М.: Наука. 1983. С. 354.
8. Костюченко А. Г., Саргсян И. С. Распределение собственных значений (самосопряженные обыкновенные дифференциальные операторы). М.: Наука. 1979. С. 400.
9. Валеев Н. Ф., Назирова Э. А., Султанаев Я. Т. О новом подходе к изучению асимптотического поведения решений сингулярных дифференциальных уравнений // Уфимск. матем. журн., 2015. Т. 7. №3. С. 9–15.
10. Муртазин Х. Х., Султанаев Я. Т. К формулам распределения собственных чисел неполуограниченного оператора Штурма-Лиувилля // Математические заметки. 1980. Т. 28:4. С. 545–553.
11. N. F. Vileev, Ya. T. Sultanaev On the deficiency indices of a singular Sturm-Liouville operator with a rapidly oscillating perturbation // Doklady Mathematics. 2000. V. 62. №2. P. 271–273.
12. Валеев Н. Ф., Назирова Э. А., Султанаев Я. Т. О распределении собственных значений сингулярных дифференциальных операторов в пространстве вектор-функций // Тр. ММО. 2014. Вып. 2. С. 107–123.
13. Myakimova O. V., Nazirova E. A., Valeyeva L. R. On asymptotic behavior of solutions of the first-order differential equations with a strongly oscillating coefficient // Vestnik Bashkirskogo universiteta. Vol. 21. 2016. No. 3. Pp. 549–550.
14. Макина Н. К., Назирова Э. А., Султанаев Я. Т. О методах исследования асимптотического поведения сингулярных дифференциальных уравнений // Математические заметки. 2014. Т. 96. С. 627–632.
15. Султанаев Я. Т. Об асимптотике спектра дифференциального оператора в пространстве вектор-функций // Диф. Уравнения. 1974. Т. 10. №9. С. 1673–1683.
16. Исмагилов Р. С. Об асимптотике спектра дифференциального оператора в пространстве вектор-функций. // Математические заметки. 1971. Т. 9. №6. С. 66–675.
17. Султанаев Я. Т., Сагитова А. Р. Сингулярные дифференциальные уравнения // Фундам. пробл. мат. и мех. Мат. Ч. 1, МГУ. М. 1994. С. 189–191.
18. Levinson N. The asymptotic behavior of a system of linear differential equations. // Amer. Journ. Math. 68. 1946. P. 1–6.
19. Cronwall T. H. Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a systems of differential equations // Ann. of Math. 20. 1918. P. 292296.
20. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Мир. 1970. С. 720.

Поступила в редакцию 19.05.2019 г.

ON THE ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF SOLUTIONS OF A SYSTEM OF SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS

© A. R. Sagitova^{1*}, A. A. Kadyrberdina²

¹Bashkir State University

32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.

²M. Akmulla Bashkir State Pedagogical University

3a Oktyabrskoi Revolutsii Street, 450008 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.

Phone: +7 (917) 344 17 77.

*Email: mohlesnoy@yandex.ru

The need to study the stability of systems in mechanics arose for the first time while studying the equilibrium positions of a system. After which a general formulation of the problem of motion stability was required. The study of the stability criteria of many mechanical systems' motion often comes down to analysis of asymptotic behavior and stability of linear differential equations' solutions. The equations considered in the paper are not only of mathematical interest, but also arise in classical mechanics, electrodynamics, and oscillation theories. Levinson's method of reducing systems to the L-diagonal form is widely known. Levinson studied systems of the form $Y' = WY + CY$, where W is a diagonal matrix and C is a matrix with summable coefficients. This method is the basis of many studies of the asymptotic behavior of solutions of singular high order differential equations. Yet for systems considered in this article, Levinson's method is not applicable. Bellman proved the theorem on asymptotic behavior of the fundamental system of solutions of the system

$$\frac{dz}{dt} = (A + \varphi(t) + B(t))z.$$

Here A is a constant matrix with simple eigenvalues. The eigenvalues $\lambda_i(t)$ of the matrix $A + \varphi(t)$ have different real parts. $\varphi \rightarrow 0$, when $t \rightarrow \infty$. $\int_x^\infty \|d\varphi/dt\|dt < \infty$. Moreover, a rather strong descending condition $\int_x^\infty \|B(t)\|dt < \infty$ is imposed on elements of matrix $B(t)$, which, in fact, means that the elements of matrix $B(t)$ are decreasing functions. This implies in particular that $\sin e^t$ -type functions cannot be taken as elements of matrix $B(t)$. In the presented work, the authors proved the theorem on asymptotic behavior of solutions of the fundamental system

$$\frac{dz}{dt} = (A + Bf(t))z,$$

where $z = (z_1, z_2)^T$, B – is a constant matrix, A – is a matrix with various real eigenvalues, and $f(t)$ has a summable at infinity primitive $\varphi(t) = \int_t^\infty f(\tau)d\tau < \infty$. The latter makes it possible to expand the scope of the theorem in comparison with the previous cases. From the obtained asymptotic formulas, it follows in particular that if the eigenvalues are negative, then the non-zero solution of the system is Lyapunov asymptotically stable. The obtained result can be widely used to study systems of differential equations in the case of complex eigenvalues with negative real parts.

Keywords: asymptotic behavior, solutions, system, differential equations.

Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.

REFERENCES

1. Bellman R. E. Teoriya ustoychivosti reshenii differentsial'nykh uravnenii [The theory of stability of solutions of differential equations]. M: izd-vo inostrannoi literatury. 1954. Pp. 196.
2. Merkin D. R. Vvedenie v teoriyu ustoychivosti dvizheniya [Introduction to the theory of motion stability]. M: Nauka. 1987. Pp. 304.
3. Naimark M. A. Lineinye differentsial'nye operatory [Linear differential operators]. Moscow: Nauka. 1969. Pp. 476.
4. Nazirova E. A., Sagitova A. R., Kadyrberdina A. A. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2017. Vol. 22. No. 3. Pp. 632–634.
5. Sagitova A. R., Kadyrberdina A. A. Spektral'naya teoriya i smezhnye voprosy. Sb. tezisov mezhdunar. konf. Ufa. 2018. Pp. 137–138.
6. Fedoryuk M. V. 3 ed. Saint Petersburg: Lan'. 2003. Pp. 448.

7. Fedoryuk M. V. Asimptoticheskie metody dlya lineinykh obyknovennykh differentsial'nykh uravnenii [Asymptotic methods for linear ordinary differential equations]. Moscow: Nauka. 1983. Pp. 354.
8. Kostyuchenko A. G., Sargsyan I. S. Raspredelenie sobstvennykh znachenii (samosopryazhennye obyknovennye differentsial'nye operatory) [Distribution of eigenvalues (self-adjoint ordinary differential operators)]. Moscow: Nauka. 1979. Pp. 400.
9. Valeev N. F., Nazirova E. A., Sultanaev Ya. T. Ufimsk. matem. zhurn., 2015. Vol. 7. No. 3. Pp. 9–15.
10. Murtazin Kh. Kh., Sultanaev Ya. T. Matematicheskie zametki. 1980. Vol. 28:4. Pp. 545–553.
11. N. F. Vfleev, Ya. T. Doklady Mathematics. 2000. Vol. 62. No. 2. Pp. 271–273.
12. Valeev N. F., Nazirova E. A., Sultanaev Ya. T. Tr. MMO. 2014. No. 2. Pp. 107–123.
13. Myakinova O. V., Nazirova E. A., Valeyeva L. R. Vestnik Bashkirskogo universiteta. Vol. 21. 2016. No. 3. Pp. 549–550.
14. Makina N. K., Nazirova E. A., Sultanaev Ya. T. Matematicheskie zametki. 2014. Vol. 96. Pp. 627–632.
15. Sultanaev Ya. T. Dif. Uravneniya. 1974. Vol. 10. No. 9. Pp. 1673–1683.
16. Ismagilov R. S. Matematicheskie zametki. 1971. Vol. 9. No. 6. Pp. 66–675.
17. Sultanaev Ya. T., Sagitova A. R. Fundam. probl. mat. i mekh. Mat. Pt. 1, MGU. M. 1994. Pp. 189–191.
18. Levinson N. Amer. Journ. Math. 68. 1946. Pp. 1–6.
19. Cronwall T. H. Ann. of Math. 20. 1918. Pp. 292–296.
20. Hartman P. Obyknovennye differentsial'nye uravneniya [Ordinary differential equation]. Moscow: Mir. 1970. Pp. 720.

Received 19.05.2019.